

## **ABSTRAK**

Persalinan merupakan fungsi fisiologis, baik secara normal atau persalinan secara operasi *sectio caesarea*. Hal yang penting dalam periode pasca pembedahan yaitu mobilisasi dini. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu post SC (*sectio caesarea*) tentang mobilisasi dini dengan pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien post operasi *sectio caesarea*.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian ibu nifas pasca operasi *sectio caesarea* yang diambil dengan teknik *purposive sampling* sejumlah 31 responden. Variabel *Independent* adalah pengetahuan ibu post SC tentang mobilisasi, sedangkan variabel *Dependent* adalah pelaksanaan mobilisasi. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan kuisioner tertutup. Untuk menganalisis adanya hubungan digunakan uji *chi square* dengan menggunakan SPSS  $\alpha = 0,05$ .

Hasil penelitian uji *chi-square* dengan  $\alpha = 0,05$ , dari pengetahuan ibu post SC (*sectio caesarea*) tentang mobilisasi dengan pelaksanaan mobilisasi didapatkan p-value 0,001 ( $<0,05$ ), OR (20.192), C (0.345) yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada ibu post SC (*sectio caesarea*) tentang cara melakukan mobilisasi terhadap pelaksanaan mobilisasi yaitu berpengetahuan cukup. Saran bagi petugas kesehatan khususnya bidan pada ruang nifas diharapkan dapat memberikan penyuluhan yang maksimal, mendemonstrasikan, menyediakan media agar pasien dapat termotivasi untuk melakukan mobilisasi dini.

Kata kunci : Pengetahuan post SC (*sectio caesarea*), Mobilisasi

## **ABSTRACT**

*Childbirth is a physiological function, either normally or labor by sectio caesarea. The important thing in the post-operative period is early mobilization. The purpose of this study was to determine the relationship of knowledge of post SC mothers (sectio caesarea) about early mobilization with the implementation of early mobilization in post operative sectio caesarea patients.*

*The research design used in this study was cross sectional analytic. The sample in this study was part of postpartum caesarean postpartum mothers taken by simple random sampling technique of 31 respondents. The Independent variable is post SC's knowledge about mobilization, while the Dependent variable is the implementation of mobilization. Data collection uses observation sheets and closed questionnaires. Chi square test was used to analyze the relationship using SPSS  $\alpha = 0.05$ .*

*The results of the chi-square test with  $\alpha = 0.05$ , from the knowledge of post SC mothers (sectio caesarea) about mobilization with the implementation of mobilization, obtained p-value 0.001 ( $<0.05$ ), OR (20.192), C (0.345) which means  $H_0$  was refused and  $H_a$  was accepted.*

*Based on the description above it can be concluded that the knowledge of post SC mothers (sectio caesarea) about how to mobilize the implementation of mobilization. Suggestions for health workers are expected to provide maximum counseling, demonstrate, provide media so that patients can be motivated to do early mobilization.*

*Keywords:* Post SC knowledge (sectio caesarea), Mobilization