

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN DIARE PADA ANAK DI RUANG ANAK RSUD dr. R. KOESMA TUBAN

Oleh : Nanik Nasikhatul Farida

NIM.P27820516014

Diare adalah buang air besar yang tidak normal dan berbentuk cair dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya. Bayi dikatakan diare bila sudah lebih dari 3 kali buang air besar, sedangkan neonatus dikatakan diare bila sudah lebih dari 4 kali buang air besar. Berdasarkan data dari RSUD dr.R.Koesma Tuban diperoleh kejadian rawat inap diare pada anak usia 0-14 tahun selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sebesar 425 klien, tahun 2017 sebesar 182 klien dan 2018 sebesar 18 klien. Meskipun angka kejadian diare mengalami penurunan tetapi diare masih menjadi penyakit yang menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Asuhan Keperawatan Diare Pada Anak di Ruang Anak RSUD dr.R. Koesma Tuban.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian studi kasus keperawatan adalah desain asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian keperawatan adalah dua klien Diare dengan masalah keperawatan yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan munculnya diagnosa keperawatan pada kedua pasien, yaitu kurang volume cairan berhubungan dengan output melalui rute normal (diare, muntah), status hipermetabolik dan pemasukan cairan yang terbatas. Penyusunan intervensi disesuaikan dengan kondisi klien. Pada implementasi yang paling diutamakan yaitu pemberian serta monitor pemberian cairan intravena. Evaluasi yang didapatkan dari kedua pasien yaitu kebutuhan rehidrasi teratasi .

Pemberian tindakan keperawatan pada anak dengan diare harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Kolaborasi dengan keluarga sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan jika terjadi diare berulang.

Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Diare, Pada Anak.

ABSTRACT

NURSING CARE FOR DIARRHEA ON CHILDREN IN THE CHILDREN'S ROOM AT RSUD dr. R KOESMA TUBAN

**By : Nanik Nasikhatul Farida
NIM.P27820516014**

Diarrhea is abnormal and liquid bowel movements with more frequency than usual. Babies are said to have diarrhea if they have more than 3 bowel movements, while neonates are said to have diarrhea if they have more than 4 times defecated. Based on data from dr. R. Koesma Tuban Hospital, the incidence of diarrhea hospitalization on children aged 0-14 years during the last 3 years, from 2016 to 425 clients, in 2017 amounted to 182 clients and 2018 by 18 clients. Although the incidence of diarrhea has decreased, diarrhea is still a deadly disease.. This study aims to determine Nursing Care for Diarrhea on Children in the Children's Room of RSUD dr. R Koesma Tuban.

The research design used nursing care design which included assessment, nursing diagnosis, planning, implementation, and evaluation. The research subjects used in nursing research were two Diarrhea clients with the same nursing problems.

The results showed the emergence of nursing diagnoses in both patients, namely lack of fluid volume associated with excessive output and limited fluid intake. The preparation of interventions was tailored to the conditions of the clients. The most preferred implementation was giving and monitoring intravenous fluids. The evaluation obtained from the two patients was that the need for rehydration was resolved.

Giving nursing care to children with diarrhea must be adjusted to the current situation. Collaboration with family is needed for prevention and recurrent diarrhea.

Keywords: Nursing care, diarrhea, in children.