

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN MENYUSUI TIDAK EFEKTIF PADA IBU *POST* SEKSIO SESARIA ATAS INDIKASI PREEKLAMPSIA BERAT DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Oleh : Erwina Nur Arifa

Ibu yang mengalami preeklamsia berat dilakukan terminasi kehamilan yaitu harus segera melahirkan bayinya. salah satunya dengan tindakan seksio sesaria. Ibu yang mengalami proses persalinan melalui tindakan seksio sesaria akan mengalami kesulitan IMD oleh kelemahan akibat pengaruh anastesi yang diberikan sebelumnya dan sayatan pada perut ibu. Oleh karena itu, ibu dengan seksio sesaria bisa menyusui setelah lewat beberapa jam setelah melahirkan.

Penulisan ini bertujuan mengetahui asuhan keperawatan menyusui tidak efektif pada ibu *post* seksio sesaria atas indikasi preeklamsia berat. Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan metode pendekatan proses keperawatan. subyek studi kasus ini adalah 2 ibu *post* seksio sesaria atas indikasi preeklamsia berat di RS Universitas Airlangga Surabaya.

Hasil dari studi kasus ini ditemukan diagnosis keperawatan yang sama yaitu menyusui tidak efektif dibuktikan dengan adanya ketidaktahuan ibu akan manfaat dan pentingnya ASI bagi ibu dan bayi dan posisi menyusui yang benar. Perencanaan berfokus pada ibu dan keluarga untuk melakukan pemberian ASI secara dini. Evaluasi yang didapat setelah pelaksanaan proses keperawatan selama 3 hari pada 2 klien adalah menunjukkan adanya peningkatan pemberian ASI.

Diharapkan bagi tenaga medis untuk meningkatkan pengetahuan manfaat dan pentingnya ASI serta dukungan untuk ibu untuk sedini mungkin memberikan ASI.

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Preeklamsia Berat, Seksio Sesaria, Menyusui Tidak Efektif

ABSTRACT

MATERNITY NURSING CARE WITH INEFFECTIVE BREASTFEEDING PROBLEMS IN WOMEN POST CAESAREAN SECTION FOR INDICATIONS OF SEVERE PREECLAMPSIA AT AIRLANGGA UNIVERSITY HOSPITAL SURABAYA

By : Erwina Nur Arifa

Mothers who experience severe preeclampsia do termination of pregnancy which must immediately give birth to their baby, one of them with cesarean section. Mothers who experience childbirth through cesarean section will experience IMD difficulties by weakness due to the influence of anesthetics given previously and incisions in the mother's abdomen. Therefore, mothers with cesarean section can breastfeed after a few hours after giving birth.

The aim of this paper is to find out that nursing care is not effective in post-cesarean mothers for indications of severe preeclampsia. The type of writing used is descriptive writing in the form of case studies with the nursing process approach method. The subjects of this case study were 2 post cesarean mothers for indications of severe preeclampsia at Airlangga University Hospital, Surabaya.

The results of this case study found the same nursing diagnosis of ineffective breastfeeding as evidenced by the mother's ignorance of the benefits and importance of breast milk for mothers and infants and the correct position of breastfeeding. Planning focuses on mothers and families for early breastfeeding. Evaluation obtained after the implementation of the nursing process for 3 days on 2 clients is showing an increase in breastfeeding.

It is hoped that medical staff will increase the knowledge of the benefits and importance of breastfeeding and support for mothers to breastfeed as early as possible.

Keywords: Nursing care, severe preeclampsia, cesarean section, ineffective breastfeeding