

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN MASALAH DEFISIT PERAWATAN DIRI PADA KLIEN SKIZOFRENIA HEBEFRENIK DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA

Oleh: Savira Fi awwalin Nuha

Defisit perawatan diri pada klien skizofrenia hebefrenik merupakan suatu kondisi seseorang mengalami kelemahan kemampuan dalam melakukan perawatan diri secara mandiri, sehingga menyebabkan gangguan fisik dan gangguan psikososial. Angka kejadian Skizofrenia di Surabaya mencapai 26,5% dan diketahui 9,1% mengalami defisit perawatan diri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Asuhan Keperawatan dengan masalah defisit perawatan pada klien skizofrenia hebefrenik.

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan mengambil dua kasus sebagai unit analisis. Unit analisis adalah dua klien laki-laki dengan skizofrenia hebefrenik di Ruang Kenari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Pengumpulan data kedua kasus menggunakan metode wawancara klien, observasi, dan catatan rekam medis klien. Instrumen pengumpulan data menggunakan format asuhan keperawatan jiwa dari buku Proses Keperawatan Jiwa.

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa defisit perawatan diri pada klien skizofrenia hebefrenik disebabkan karena peran diri yang dianggap buruk menurut klien itu sendiri dan pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan.

Diharapkan bagi klien skizofrenia dengan defisit perawatan diri mampu melakukan kegiatan perawatan diri secara mandiri. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi tentang peningkatan mutu Asuhan Keperawatan dengan masalah defisit perawatan diri pada klien skizofrenia hebefrenik.

Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Skizofrenia Hebefrenik, Defisit Perawatan Diri

ABSTRACT

Nursing Care of Self Care Deficit Problems in Schizophrenia Hebephrenic Clients at Menur Mental's Hospital Surabaya

By : Savira Fi awwalin Nuha

Self-care deficit in hebephrenic schizophrenic clients is a condition where a person experiences a weakness of ability to perform self-care independently, thus causing physical and psychosocial disorders. The incidence of schizophrenia in Surabaya reaches 26.5% and it is known that 9.1% has a self-care deficit. Therefore, this study aims to determine Nursing Care with care deficit problems in hebephrenic schizophrenic clients.

The study used a descriptive research method with nursing care approach by taking two cases as the unit of analysis. The unit of analysis was two clients with hebephrenic schizophrenia in the Walnut Room of the Menur Mental Hospital in Surabaya. Research data were collected using client interview methods, observations, and client medical records. Data collection instruments used the format of psychiatric nursing care from the *Psychiatric Nursing Process* book

Based on the analysis of the data it was result that the deficit of self-care in hebephrenic schizophrenic clients was caused by the role of the self which was considered bad according to the client itself and unpleasant past experiences.

It is expected that schizophrenic clients with self-care deficits will be able to carry out self-care activities independently. It is hoped that the results of this study can be used as a medium of information about improving the quality of Nursing Care with self-care deficit problems in hebephrenic schizophrenic clients.

Keywords: Nursing Care, Schizophrenia Hebephrenic, Self Care Deficit Problems