

## ABSTRAK

### FAKTOR PENYEBAB DERMATITIS KONTAK PADA NELAYAN DI DESA SOCO REJO KECAMATAN JENU

Oleh :

**Dhia Nur Hidayatin**  
**NIM. P27820518017**

Dermatitis kontak banyak terjadi pada nelayan bisa diakibatkan karena faktor internal dan eksternal. Data dari dinas kesehatan Kabupaten Tuban, penderita dermatitis kontak pada tahun 2019 sebanyak 605 penderita. Dermatitis kontak dapat dicegah dengan Upaya peningkatan perilaku kesehatan dan lingkungan baik di tempat kerja atau di rumah, memakai alat pelindung diri yang bersih dan membiasakan mencuci anggota badan setelah selesai bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum faktor penyebab terjadinya dermatitis kontak pada nelayan di desa socio rejo kecamatan jenu, kabupaten tuban.

Desain penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *non eksperimental*. Populasinya adalah nelayan sejumlah 122 orang, dengan besar sampel 93 nelayan. Teknik pengambilan sampel *simple random sampling*, variable penelitian faktor penyebab dermatitis kontak pada nelayan, pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian diolah dan ditabulasi secara deskriptif.

Hasil penelitian di dapatkan faktor penyebab dermatitis kontak pada nelayan sebagian besar (55%) dengan umur 36-45, hampir seluruhnya (77%) nelayan memakai APD, hampir seluruhnya (97%) nelayan memiliki hygiene personal yang buruk. Sebagian besar (75%) masa kerja nelayan > 6 tahun. Sebagian besar (73%) nelayan tidak memiliki riwayat penyakit kulit, dan sebagian besar (68%) tidak memiliki riwayat alergi.

Upaya peningkatan perilaku kesehatan pribadi dan lingkungan baik di tempat kerja atau di rumah, memakai alat pelindung diri yang bersih dan membiasakan mencuci anggota badan setelah selesai bekerja, dan diperlukan tindakan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan dalam bentuk penyuluhan tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya dermatitis kontak akibat kerja pada nelayan.

**Kata Kunci : Faktor penyebab, Dermatitis Kontak, Nelayan**

## **ABSTRACT**

### **CAUSING FACTORS OF CONTACT DERMATITIS IN FISHERMEN IN SOCO REJO VILLAGE, JENU SUB-DISTRICT**

**By:**

**Dhia Nur Hidayatin**  
**NIM. P27820518017**

Contact dermatitis that most frequently occurs in fishermen can be caused by internal and external factors. According to the data from the Tuban District Health Office showed that there were 605 patients with contact dermatitis in 2019. Contact dermatitis can be prevented by improving health and environmental behavior both at work and at home, wearing clean personal protective equipment and making habit to always wash hands or clean up after work. The objective of this study was to determine the overview of the causing factors of contact dermatitis in fishermen in Soco Rejo Village, Jenu Sub-District, Tuban Regency.

This study is descriptive research with a non-experimental approach. The population in this study was 122 fishermen. The samples were 93 fishermen. The sampling technique uses simple random sampling. The research variables were the factors causing contact dermatitis in fishermen. Data were collected, processed, and tabulated descriptively.

The results of the study showed that the causing factors of contact dermatitis in fishermen were mostly aged 36-45 years (55%), almost all fishermen wore PPE (77%), almost all fishermen had poor personal hygiene (97%). Most fishermen have more than 6 years of experience (75%). Most fishermen have no history of skin disease (73%), and most fishermen have no history of allergies (68%).

Efforts to improve personal and environmental health behavior both at work and at home includes wearing clean personal protective equipment and making habit to always wash hands or clean up after work. It is necessary for health workers to carry out further action in the form of counseling about the

importance of using personal protective equipment to prevent the incidence of occupational contact dermatitis in fishermen.

**Keywords: Causing Factor, Contact Dermatitis, Fishermen**