

SINOPSIS

Asuhan *continuity of care* dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya komplikasi dari kehamilan, bersalin, nifas, neonatus, maupun dalam penggunaan pelayanan kontrasepsi. Dengan mengenali secara dini berbagai faktor resiko yang ditemukan saat memberikan asuhan, ibu mampu menghindari timbulnya masalah – masalah serius sehingga tidak terjadi komplikasi. Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. F G_{IV}P_{II}A₁ umur kehamilan 37 minggu dengan resiko tinggi janin tunggal, hidup, *intra uteri*, letak kepala di PMB “T” Kamal wilayah Puskesmas Kamal Kabupaten Bangkalan, kehamilan dengan *usia >35 tahun dan riwayat abortus* beresiko akan terjadi komplikasi baik pada kehamilan maupun persalinan seperti hipertensi pada kehamilan, perdarahan pada saat persalinan dan nifas.

Metode yang digunakan dalam memberikan asuhan kebidanan yaitu manajemen kebidanan secara *continuity of care* merupakan asuhan kebidanan dimana seorang wanita mampu mengembangkan hubungan dengan bidan untuk melakukan asuhan selama hamil, persalinan, nifas, dan sampai pelayanan kontrasepsi.

Pada saat kunjungan pertama pada masa hamil ibu memiliki keluhan sering pusing jika aktifitas dan menganjurkan ibu istirahat yang cukup, pada kunjungan ke dua istirahat ibu teratasi. Pada masa nifas dan neonatus dilakukan kunjungan 3 kali, pada saat kunjungan nifas ke tiga ibu mengalami sembelit jika BAB diberikan asuhan kebidanan seperti makan-makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, buah dan kebutuhan air tercukupi, dan melakukan asuhan kebidanan keluarga berencana dengan memberikan konseling tentang macam-macam alat kontrasepsi dan ibu memilih menggunakan metode KB suntik 3 bulan (progestin)

Asuhan kebidanan yang telah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan teori keluhan yang di dapatkan pada saat kunjungan ANC dapat teratasi selama proses persalinan berlangsung secara normal, keluhan pada saat kunjungan nifas dapat teratasi, neonatus dan kontrasepsi berjalan normal, bayi menyusu dengan adekuat. Kontrasepsi yang dipilih merupakan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu menyusui yaitu KB suntik 3 bulan. Setelah melakukan asuhan secara *continuity of care* ini maka diharapkan klien tetap memperhatikan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak agar tidak terjadi masalah selama hamil, bersalin, nifas, neonatus dan kontrasepsi. Membawakan anaknya ke posyandu secara rutin. Melakukan kunjungan KB sesuai dengan keluhan atau waktu yang telah ditentukan.