

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan antara kadar Serum Iron (SI) dengan Total Iron Binding Capacity (TIBC) pada penderita gagal ginjal kronik didapatkan kesimpulan :

1. Rata-rata Kadar Serum Iron (SI) pada penderita gagal ginjal kronik adalah 71,8 $\mu\text{g/dL}$
2. Rata-rata Kadar Total Iron Binding Capacity (TIBC) pada penderita gagal ginjal kronik adalah 203,5 $\mu\text{g/dL}$.
3. Tidak terdapat hubungan antara Kadar Serum Iron (SI) Dengan Total Iron Binding Capacity (TIBC) pada penderita gagal ginjal kronik

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka disarankan untuk peneliti selanjutnya :

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan lebih memperhatikan untuk menggunakan kriteria yang lebih detail (adanya inflamasi, terapi atau obat - obatan yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan).
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui asupan nutrisi yang didapatkan sehari-hari oleh pasien