

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data korelasi kadar titer HBsAg terhadap sel mononuklear pada pasien positif Hepatitis B pada 30 pasien di RSUD Haji Surabaya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebanyak 46,66% pasien dengan Hepatitis B positif memiliki kadar titer HBsAg yang tinggi, 36,67% pasien memiliki kadar titer HBsAg yang rendah, dan 16,67% memiliki kadar titer HBsAg menengah.
2. Jumlah sel limfosit pada pasien positif Hepatitis B sebagian besar normal bawah sebanyak 36,7%, sedangkan jumlah sel monosit sebagian besar normal atas yaitu sebanyak 43,3%.
3. Tidak ada korelasi antara kadar titer HBsAg terhadap sel mononuklear pada pasien positif Hepatitis B.

7.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya bisa dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mengetahui fase dan lama infeksi virus Hepatitis B dan mengelompokkan data berdasarkan fase-nya untuk dapat diketahui lebih lanjut apakah ada korelasi antara kadar titer dengan sel mononuklear.

2. Bagi penderita Hepatitis B disarankan untuk menjaga pola makan dengan mengurangi makanan yang berlemak, menjaga pola perilaku agar tidak menularkan kepada orang lain, dan melakukan pengobatan serta pemeriksaan rutin.