

## SINOPSIS

Setiap wanita yang hamil tentu sangat mengharapkan kehamilan, persalinan hingga nifasnya dapat berlangsung dengan aman dan sehat sehingga dapat melahirkan seorang bayi yang sehat pula. Tetapi komplikasi saat kehamilan, persalinan dan nifas mungkin dapat terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan asuhan secara *continuity of care* dengan tujuan deteksi dini risiko tinggi dan komplikasi. Standar pelayanan antenatal pada masa pandemi adalah minimal 6 kali selama kehamilan, asuhan persalinan di observasi menggunakan partograf, kunjungan masa nifas dan neonatus dilakukan minimal 4 kali dan penggunaan KB pasca salin yang tepat dalam setiap kunjungan tentunya menggunakan protokol kesehatan demi meminimalkan terpaparnya virus Covid-19 pada pemeriksa dan pasien.

Pemberian asuhan kebidanan pada Ny. "R" G<sub>4</sub>P<sub>30003</sub> usia 39 tahun, dilakukan pertama kali saat usia kehamilan 38-39 minggu. Kehamilan ibu termasuk Kehamilan Risiko Tinggi (KRT) dengan SPR 10. Bayi lahir spontan, belakang kepala tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.15 WIB, menangis kuat, gerak aktif, jenis kelamin perempuan, dilakukan IMD, keadaan fisik normal, tidak ada kelainan kongenital/cacat bawaan. Plasenta lahir spontan dan tidak terjadi perdarahan. Masa nifas berlangsung normal, laktasi, involusi dan lochea normal, psikologi ibu baik. Tali pusat bayi lepas pada hari ke-7 dan tidak ada infeksi. Berat badan bayi mengalami kenaikan 800 gram selama 1 bulan dan tumbuh kembang bayi normal. Ny. "R" memilih menggunakan KB MAL dan setelah KB MAL ibu berencana menggunakan KB suntik 3 bulan. Selama dilakukan asuhan ibu dan bayi menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terpapar Covid-19.

Pelaksanaan asuhan kebidanan sudah disesuaikan dengan perencanaan berdasarkan kondisi, masalah dan kebutuhan ibu. Tahap evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan. Status kesehatan ibu baik, walaupun terdapat keluhan namun ibu sudah mendapatkan penjelasan mengenai cara mendeteksi adanya masalah dan melaksanakan asuhan secara mandiri.

Dapat disimpulkan bahwa pemberian asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada Ny. "R" selama masa kehamilan trimester III, persalinan, nifas, neonatus yang dilahirkan dan KB secara keseluruhan berjalan normal. Ibu diharapkan dapat menerapkan asuhan yang diperoleh secara mandiri, mampu memantau kesehatan diri dan bayinya, dengan tetap berkonsultasi pada petugas kesehatan/bidan terdekat.