SINOPSIS

Setiap wanita yang berada pada masa reproduksi akan mengalami kehamilan, persalinan, masa nifas, dan kelahiran bayi yang normal tanpa adanya kelainan dan penyulit dan kemudian memutuskan untuk progam keluarga berencana. Keadaan tersebut merupakan suatu keadaan berkesinambungan dalam kehidupan wanita yang timbul secara alami atau fisiologis, namun seiring perjalanannya dapat berubah kearah patologis jika ada penyulit. Oleh karena itu perlu pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan. Deteksi dan penanganan secara dini melalui asuhan kebidanan secara *continuity of care* akan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan kesejahteraan bayi yang dilahirkan.

Asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada Ny."U" G2P00010 Usia 27 tahun dari kehamilan trimester III, bersalin, nifas, neonatus, dan KB pasca salin dilakukan di Puskesmas Panekan, Magetan. Pemberian asuhan dimulai tanggal 9 Februari 2024 sampai tanggal 19 April 2024. Selama kehamilan berjalan dengan normal, kehamilan resiko tinggi dengan KSPR 6. Ibu bersalin pada usia kehamilan 40-41 minggu, secara SC di RSIA Melati Magetan, dengan indikasi *oligohidramnion* dan *post date* dalam kehamilan. Pada masa nifas dilakukan kunjungan sebanyak 4x. *Laktasi, involusi, lochea* normal serta keadaan psikologis ibu baik. Pada Kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3x dengan hasil pemeriksaan bayi Ny."U" dengan pertumbuhan dan perkembangan normal, tetapi sempat mengalami ikterik pada kunjungan hari ke 6 dan sudah teratasi. Ibu dan suami sudah sepakat, bahwa suami akan menggunakan KB Kondom untuk mencegah kehamilan.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan yang telah dilakukan secara *continuity* of care asuhan diberikan sesuai standart pelayanan dan ibu kooperatif dalam pelaksanaan asuhan. Pada akhir asuhan ibu menjadi lebih mandiri dalam merawat dirinya dan mengasuh bayinya. Proses persalinan dilakukan secara SC dengan indikasi oligohidramnion dan post date, masa nifas laktasi, involusi normal, lochea normal, neonatus normal tetapi sempat mengalami ikterik pada hari ke 6 dan sudah teratasi, dan ibu dan suami sepakat menggunakan KB Kondom untuk mencegah kehamilan.

Dari hasil asuhan kebidanan yang dilakukan secara berkesinambungan didapatkan hasil bahwa Ny. "U" hamil, bersalin, neonatus, nifas normal dan akseptor KB MAL. Mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan pengalaman yang telah didapatkan serta dapat menerapkan asuhan kebidanan secara koomperhensif atau berkesinambungan pada ibu hamil trimester III, bersalin, nifas, neonatus, dan keluarga berencana.