

## SINOPSIS

Perdarahan *postpartum* merupakan penyebab utama kematian ibu baik di negara berkembang maupun di negara maju. Sekitar hampir 25% kematian ibu di seluruh dunia disebabkan oleh perdarahan *postpartum*. Perdarahan *postpartum* dapat menimbulkan dampak seperti syok *hemorrhagic*, anemia dan sindrom Sheehan. Akibat terjadinya perdarahan, ibu akan mengalami syok dan menurunnya kesadaran akibat banyaknya darah yang keluar. Deteksi dan penanganan secara dini melalui asuhan kebidanan secara *continuity of care* akan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan kesejahteraan bayi yang dilahirkan. Laporan ini merupakan laporan kasus dengan pendekatan asuhan kebidanan 5 langkah dengan mengambil satu kasus ibu hamil trimester III dan diberikan asuhan sampai keluarga berencana. Asuhan kebidanan dilakukan secara *continuity of care* dengan melakukan evaluasi asuhan menggunakan SOAP. Asuhan kebidanan pada Ny. "S" G3P10011 usia 22 tahun, dilakukan pertama kali saat usia kehamilan 38 minggu.

Asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada Ny. "S" G3P10011 dimulai tanggal 07 Februari 2024 sampai tanggal 05 April 2024. ANC dengan pendampingan sebanyak 1x dengan keluhan sering BAK pada TM III. Kehamilan resiko sangat tinggi dengan SPR 14, risiko PE, dan waspada perdarahan. Ibu bersalin pada usia kehamilan 41-42 minggu, secara SC di RSIA Melati dengan indikasi *postdate* dalam kehamilan. Proses persalinan secara SC, jenis kelamin laki-laki, menangis kuat, gerak aktif, tidak ada cacat bawaan. Setelah lahir bayi tidak dilakukan IMD, plasenta lahir lengkap, laktasi, lochea, involusi normal dan tidak ada perdarahan setelah melahirkan. Pada masa nifas dilakukan kunjungan sebanyak 4x dengan kunjungan pertama terdapat keluhan nyeri luka jahitan SC. Hari ke-18 *postpartum* plester anti air sudah dilepas, jahitan tertaut rapi, kering, tidak ada keloid. Laktasi, involusi, lochea normal serta keadaan psikologis ibu baik. Pada kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3x dengan hasil pemeriksaan bayi Ny. "S" dengan pertumbuhan dan perkembangan normal. Ibu menjadi calon akseptor KB suntik 3 bulan.

Hasil asuhan kehamilan ibu berjalan normal dengan keluhan sering BAK pada TM III ibu dapat beradaptasi dengan keluhan yang dialami. Proses persalinan secara SC atas indikasi *postdate*, masa nifas berjalan normal dengan keluhan nyeri luka jahitan pasca operasi masalah dapat teratasi dengan baik pada hari ke-18, neonatus normal tanpa komplikasi dan ibu calon peserta KB suntik 3 bulan. Hasil asuhan kebidanan secara *continuity of care* yang dilakukan sejak masa kehamilan sampai KB pascasalin berjalan normal.

Kesimpulan asuhan kebidanan yang diberikan secara *continuity of care* dapat diberikan mulai dari kehamilan sampai KB dengan optimal di fasilitas kesehatan serta memberikan layanan kebidanan secara komprehensif dan sesuai dengan *evidence based*.