

## RINGKASAN

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2021 yaitu 7.389 sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 yaitu 27. 566 kasus. Salah satu upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yaitu dengan *Continuity Of Care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan keluarga berencana. Tujuan Laporan Tugas Akhir (LTA) yaitu sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma 3 Pada Program Studi D3 Kebidanan.

Metode yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir (LTA) ini adalah Manajemen Kebidanan yang dilakukan secara *continuity of care* adalah asuhan yang dilakukan secara berkelanjutan dari Masa Hamil dilakukan kunjungan 3 kali, yaitu pada usia kehamilan 35, 37/38 dan 40 Minggu. Bersalin berlangsung secara fisiologis di PMB Afah Fahmi. Nifas dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali yaitu Kunjungan I (6 jam), Kunjungan II (7hari), Kunjungan III (10 hari), Kunjungan IV (29hari). Neonatus dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali yaitu Kunjungan I (usia 2 jam), Kunjungan II (usia 48 jam), Kunjungan III (usia 7 hari), Kunjungan IV (usia 14 hari). Keluarga Berencana (KB) dilakukan kunjungan sebanyak 2 kali. Asuhan berkelanjutan pada Ny. N dilakukan di Puskesmas Balongsari Surabaya.

Hasil yang diperoleh asuhan kebidanan pada Ny.N hamil trimester III, bersalin, nifas, neonatus sampai dengan keluarga berencana yaitu pada Kehamilan masalah fisiologis selama masa kehamilan dapat diatasi dengan pemberian pendidikan kesehatan dan tidak didapatkan penyulit. Persalinan berlangsung secara normal di PMB Afah Fahmi, Kala I berlangsung selama 60 menit, Kala II berlangsung selama 7 menit, dan Kala III berlangsung selama 12 menit. Asuhan masa nifas dilakukan pemeriksaan difasilitas kesehatan dan kunjungan dirumah pasien, ASI lancar tidak terdapat bendungan dan abses payudara. kunjungan I (6 jam) lochea rubra, kunjungna II (7 hari) lochea sanguinolenta, kunjungan III (10 hari) lochea serosa, kunjungan IV (29 hari) lochea alba. Bayi diberikan ASI eksklusif, tidak terdapat ikterus, kunjungan I (usia 2 jam) BB 3050 gram, kunjungan II (usia 48 jam) BB 3050 gram, kunjungan III (usia 7 hari) BB 3200 gram, kunjungan IV (usia 14 hari) BB 3350 gram. Melalui konseling KB ibu memutuskan memakai KB suntik 3 bulan.

Setelah dilakukan asuhan, ibu merasa senang terhadap pendekatan dengan pemeberian asuhan dari masa hamil sampai dengan penggunaan alat kontrasepsi. Asuhan yang diberikan kepada Ny.N berlangsung dengan normal dan tidak ditemukan adanya komplikasi. Disarankan kepada bidan untuk dapat mengaplikasikan asuhan *continuity of care* sesuai dengan standart di lingkungan masyarakat.