

RINGKASAN

Berdasarkan Kemenkes (2021), jumlah angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan 97,6 per 100.000 kelahiran hidup di Indonesia. Tujuan Laporan Tugas Akhir (LTA) yaitu untuk memberikan asuhan kebidanan dengan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir atau neonatus, dan masa antara.

Metode yang digunakan adalah *Asuhan Continuity Of Care (COC)* adalah untuk memberikan asuhan secara berkesinambungan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. Subyek dalam asuhan ini adalah Ny.F GIP0A0 UK 27-28 minggu di Puskesmas Jagir Surabaya. Asuhan pada kehamilan dilaksanakan sebanyak 3 kali kunjungan yaitu 27-28 mg, 29-30 mg, 39-40 mg, asuhan persalinan 1 kali kunjungan, asuhan nifas 4 kali kunjungan (2 hari post partum), (7 hari post partum) (21 hari post partum) (34 hari postpartum), asuhan neonatus 4 kali kunjungan (kunjungan pertama tidak dilakukan karena bayi berada dirumah sakit) (2 hari neonatus) (7 hari neonatus) (21 hari neonatus), serta asuhan KB 2 kali kunjungan (7 hari post partum) (30 hari postpartum).

Hasil asuhan kebidanan pada Ny.F memasuki usia kehamilan 39-40 minggu pada hasil USG terakhir tafsiran berat janin tergolong besar, sehingga dilakukan rujukan. Persalinan berlangsung secara SC dengan bayi lahir sehat dan dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Asuhan masa nifas dilakukan pemeriksaan dirumah pasien, kunjungan dilakukan sebanyak 4 kali ASI lancar tidak terdapat bendungan

ASI, kunjungan I lokhea rubra (2 hari post partum), kunjungan II lokhea serosa (7 hari post partum), kunjungan III lokhea alba (21 hari post partum), kunjungan IV lokhea alba (34 hari post partum). Pada kunjungan masa neonatus dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali di dapatkan hasil bayi diberikan ASI, tidak terdapat ikterus, kunjungan I (kunjungan pertama tidak dilakukan kunjungan karena berada dirumah sakit) kunjungan II berat badan 2550 gram (2 hari neonatus), kunjungan III berat badan 2750 gram (7 hari neonatus), kunjungan IV 3100 gram (21 hari neonatus). Melalui konseling KB ibu memutuskan memakai KB suntik 3 bulan dan kunjungan dilakukan 2 kali.

Setelah dilakukan asuhan ini ibu mulai dari masa hamil sampai KB pascasalin mendapatkan pelayanan kebidanan berkesinambungan, Asuhan yang diberikan kepada Ny. F berlangsung dengan normal dan tidak ditemukan adanya komplikasi. Disarankan kepada bidan untuk dapat mengaplikasikan *asuhan continuity of care* sesuai dengan standart di lingkungan masyarakat dan klien melaksanakan sesuai asuhan yang telah diberikan.