

ABSTRAK

Studi Kasus Pada Ibu Bersalin Dengan Faktor Risiko Ruptur Perineum Di

Puskesmas Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Amelia Hairun Nisa

Jurusian Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pendahuluan: Persalinan alami merupakan salah satu metode melahirkan yang dinantikan oleh setiap wanita, Banyak ibu yang ingin melahirkan secara normal dengan sedikit trauma seperti robekan perineum, Robekan perineum merupakan robekan pada alat kelamin pada wanita yang sebagian besar disebabkan oleh proses persalinan, Ruptur perineum dapat terjadi pada area antara lubang vagina dan anus, Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perdarahan pasca melahirkan adalah adanya luka pada daerah perineum. **Metode:** Pendekatan studi kasus manjemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 2 langkah varney yaitu: pengkajian dan implementasi. **Hasil Penelitian dan Pembahasan:** sesuai hasil pengamatan ini adalah ibu bersalin dengan faktor risiko ruptur perineum dapat diatasi dengan melakukan penjahitan. Dari catatan pengkajian didapatkan faktor risiko yaitu paritas, perineum ibu kaku, cara mengejan yang salah. Dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin faktor risiko ruptur perineum hendaknya dapat meningkatkan keterampilan untuk mencegah terjadinya ruptur perineum. **Simpulan:** Pada penelitian ini didapatkan simpulan pada kedua pasien hasil dari pengkajian yaitu faktor risiko paritas, perineum kaku, cara mengejan yang salah dan pada hasil implementasi bidan melakukan episiotomi atas indikasi perineum kaku dan melakukan penjahitan.

Kata Kunci : Ibu Bersalin, Faktor Risiko, Ruptur Perineum

ABSTRACT

Case Study on Maternity Mothers with Risk Factors for Perineal Rupture at
Tulangan Health Center, Sidoarjo Regency

Amelia Hairun Nisa
Department of Midwifery Poltekkes Kemenkes Surabaya

Introduction: Giving birth naturally is one of the birth methods that every woman looks forward to. Many mothers want to give birth naturally with minimal trauma such as perineal tears. Perineal tears are tears in the genitals in women which are mostly caused by the birthing process. Perineal rupture can occur in the area between the vaginal opening and the anus. One of the factors that can cause postpartum bleeding is a wound in the perineal area. Method: Case study approach to midwifery care management which consists of 2 Varney steps, namely: assessment and implementation. Research Results and Discussion: Based on observations, women giving birth with risk factors for perineal rupture can be overcome with suturing. From the assessment notes, risk factors were found, namely parity, stiff mother's perineum, wrong way of pushing. In providing midwifery care to mothers giving birth, the risk factors for perineal rupture must be able to improve skills to prevent perineal rupture. Conclusion: In this study, conclusions were obtained for both patients from the assessment, namely risk factors for parity, perineal stiffness, incorrect pushing methods and the results of the midwife carrying out an episiotomy for indications of perineal stiffness and suturing.

Keywords: Maternal Mother, Risk Factors, Perineal Rupture