

ABSTRAK

STUDI KASUS PADA IBU POSTPARTUM DENGAN FAKTOR RISIKO INFEKSI LUKA PERINEUM DI PUSKESMAS BANYU URIP KOTA SURABAYA

Zulafati Ilma

Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Pendahuluan: Luka perineum merupakan robekan jaringan antara pembukaan vagina dan rectum. Luka jahitan perineum disebabkan oleh rusaknya jaringan yang secara alamiah karena proses desakan kepala atau bahu janin maupun karena tindakan episiotomi. Luka perineum menjadi salah satu penyebab infeksi pada perineum, hal ini diakibatkan oleh daya tahan ibu yang rendah setelah melahirkan, perawatan yang kurang baik dan kebersihan yang kurang terjaga pada perlukaan jalan lahir. **Metode:** Studi kasus ini dilakukan di puskesmas Banyu Urip Kota Surabaya pada bulan Maret-April 2024, menggunakan 2 respondent ibu nifas dengan adanya luka perineum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan Varney pengkajian dan implementasi, dan juga mengobservasi studi dokumentasi asuhan kebidanan dengan melihat data pasien di rekam medis. **Hasil dan Pembahasan:** Berdasarkan studi kasus yang telah didapatkan, terdapat perbedaan dalam proses penyembuhan luka yang dialami kedua respondent. Penulis beranggapan bahwa tidak semua ibu yang memiliki faktor infeksi pada masa kehamilannya seperti anemia yang dapat beresiko terkena infeksi pada masa nifasnya. Kesembuhan luka perineum tergantung dari cara perawatan setiap individu seorang ibu. Kesembuhan luka perineum juga dipengaruhi oleh paritas, nutrisi, dan juga personal hygiene ibu terutama pada bagian vulva. **Simpulan:** Dari pengkajian yang telah dilakukan pada kedua responden dapat disimpulkan bahwa infeksi luka perineum dipengaruhi oleh paritas, nutrisi dan personal hygiene.

Kata Kunci: Postpartum, Luka Perineum, Infeksi

ABSTRACT

CASE REPORT ON POSTPARTUM MOTHERS WITH RISK FACTORS FOR PERINEAL WOUND INFECTION AT BANYU URIP COMMUNITY HEALTH CENTER, SURABAYA CITY

Zulafati Ilma

Department of Midwifery, Health Polytechnic, Ministry of Health

ilmazulafati@gmail.com

Introduction: The postpartum period is the period after childbirth until the reproductive tract returns to its pre-pregnancy state, which lasts for 6 weeks. Perineal rupture is a tear in the tissue between the vaginal opening and the rectum. Perineal suture wounds are caused by natural tissue damage due to the pressure of the fetus' head or shoulders or due to an episiotomy. Perineal rupture is one of the causes of perineal infection, due to injuries during childbirth that make it easy for germs to enter the body. This is caused by the mother's low immunity after giving birth, poor care and poor hygiene in the birth canal wound. **Method:** This case study was conducted at the Banyu Urip Health Center in Surabaya City in March-April 2024, using 2 respondents who were postpartum mothers with perineal wounds. Data collection techniques used interview techniques, using the midwifery management approach to assessment and implementation, and also observing the study of midwifery care documentation by looking at patient data in medical records. **Results and Discussion:** Based on the case study that has been obtained, there are differences in the wound healing process experienced by the two respondents. The author assumes that not all mothers who have infection factors during pregnancy are at risk of infection during the postpartum period. Healing of perineal wounds depends on the care method of each individual mother. Healing of perineal wounds is also influenced by parity, nutrition, and also the mother's personal hygiene, especially in the vulva area. Because in the vulva area it is very easy for bacteria to enter the body. **Conclusion:** the assessment conducted on both respondents was in accordance with the SOP and the implementation provided was in accordance with the needs of each respondent.

Keywords: Postpartum, Perineal Rupture, Infection