

SINOPSIS

Kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan mata rantai yang akan dialami oleh setiap wanita. Pada masa kehamilan beberapa wanita akan mengalami kondisi yang tidak normal, salah satunya mengalami masalah kelainan letak pada janin. Bidan harus mampu memberikan asuhan kebidanan yang bersifat *Continuity Care*. Pada kasus ini asuhan diberikan pada Ny."W" di Polindes Gebang Bangkalan. Selama memberikan asuhan kondisi ibu dan janin dalam keadaan baik, hanya saja pada saat pemeriksaan ditemukan kelainan letak pada janin yaitu letak lintang, sehingga dapat ditentukan diagnosa G_{II}P₁A₀ usia kehamilan 33-34 minggu, janin tunggal, hidup, intra uterin dengan letak lintang.

Asuhan kebidanan diberikan secara *Continuity Care*, pada masa hamil mengacu pada standart pelayanan *Antenatal Care 10 T* dan deteksi resiko kehamilan menggunakan KSPR, pemberian asuhan sejak masa hamil bertujuan untuk dapat menjadikan masalah kelainan letak pada janin dapat teratasi. Agar pada saat persalinan kala I sampai kala IV juga berjalan normal. Asuhan kebidanan pada persalinan sesuai dengan APN 60 langkah, dan pemantauan kemajuan persalinan menggunakan partograf, segera setelah bayi lahir dilakukan penilaian selintas, dan dilanjutkan dengan jepit potong tali pusat serta melakukan IMD, bertujuan untuk memberikan kontak sedini mungkin ibu dan bayi, mencegah terjadinya hipotermi pada bayi, merangsang kontraksi uterus pada ibu untuk membantu pelepasan placenta pada kala III serta mencegah perdarahan pada ibu. Asuhan pada masa nifas dilakukan sebanyak 3x, dimana pada KF 1 dan KF 2 difokuskan pada pemantauan mengenai pemberian ASI, perdarahan, dan involusi uterus, sedangkan pada KF 3 asuhan nifas fokus pada pemantauan involusi dan konseling kontrasepsi, ibu disarankan untuk menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI, ibu memilih metode kontrasepsi suntik 3 bulan. Pada neonatus, tidak ditemukan masalah dan keluhan apapun, bayi dapat menyusu dengan baik dan menghisap dengan kuat, bayi tidak rewel, dan tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah ke hal yang patologis pada bayi.

Evaluasi yang diperoleh dari keseluruhan asuhan yang telah diberikan dengan menggunakan manajemen sesuai standart, bahwa masalah ibu pada saat kehamilan dapat teratasi, tidak ada komplikasi atau penyulit pada persalinan, nifas, kondisi bayi sejak lahir hingga neonatus berjalan normal serta ibu telah menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan.

Asuhan kebidanan secara berkelanjutan dapat mencegah secara dini adanya komplikasi dan mengatasi masalah yang terjadi selama hamil sampai dengan pelayanan kontrasepsi, sehingga diharapkan bidan dapat melakukan asuhan yang tepat.